

ČOPN

Český občanský spolek
proti plicním nemocem

Pro informace
o vašich plicích
se neváhejte obrátit
na České občanské
sdružení proti
plicním nemocem
– www.copn.cz

ČOPN

CHOPN

Chronická Obstrukční Plicní Nemoc



ČOPN Český občanský spolek proti plicním nemocem



Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň



copn@copn.cz
info@copn.cz



www.copn.cz




Jedná se o chronický zánět průdušek,
vedoucí k jejich postupnému zužování.
Je spojený s přestavbou a destrukcí
plicní tkáně.

Proč je CHOPN tak závažným onemocněním?

Nemocní s CHOPN se dožívají kratšího věku
než ostatní lidé a úmrtnost na CHOPN v České
republice i ve světě stále stoupá (odhadem
celosvětově až 10 % obyvatel nad 40 let trpí
CHOPN v různém stádiu).

Zánět průdušek a plicní rozedma jsou
nejčastější příčinou pracovní neschopnosti
a návštěv v plicních ambulancích po celém
světě. Onemocnění CHOPN vyžaduje v časných
i pokročilých stádiích trvalou a nákladnou
ambulantní a často i nemocniční léčbu.



Kdy je třeba pomyslet na CHOPN?

Jste-li ve věku nad 40 let, zejména současný nebo bývalý kuřák, a pozorujete tyto příznaky:

1/ Trpíte dlouhodobým kašlem (zpravidla několik měsíců v roce) spojeným s vykašláváním.

2/ Pociťujete dušnost (zadýchávání, pocit nedostatku dechu), zejména ve spojení s tělesnou zátěží nebo při nachlazení. Důležité je porovnávat schopnost tělesné zátěže s vlastními vrstevníky.

Návštěvu lékaře zbytečně neodkládejte!

Dlouhodobý kašel spojený s vykašláváním je důvodem k posouzení praktickým lékařem a následnému vyšetření plicním lékařem – <http://www.pneumologie.cz/najdi-svyho-pneumologa/>.

K vyšetření na pneumologii je vždy třeba se objednat!

Většina nemocných s CHOPN potíže podceňuje a přichází k lékaři pozdě, tj. až při zadýchávání se při tělesné zátěži. Předpokladem úspěšné léčby CHOPN je přitom včasné stanovení diagnózy a stadia CHOPN.

